両側舌咽迷走神経麻痺による嚥下障害で発症した 急性骨髄性白血病の1例

向井 泰司^{1)*} 作田 健一¹⁾ 平野 慧²⁾
鈴木 一史²⁾ 西脇 嘉一²⁾ 谷口 洋¹⁾

要旨：悪性腫瘍の斜台浸潤による生じた脳神経麻痺は、頭蓋内放射線照射で症状の軽減が期待でき、しっかり鑑別をすべき病態である。急性骨髄性白血病の斜台浸潤で両側舌咽迷走神経麻痺による嚥下障害で発症し、頭蓋内放射線照射で症状を軽減しえた83歳男性例を報告した。非常に稀ではあるが、白血病の症例において、斜台における腫瘍形成が要因となった脳神経麻痺が初期から出現することがある。白血病など癌の既往がある症例で、脳神経障害を疑った場合、鑑別として斜台浸潤の可能性に留意する必要がある。

(臨床神経 2020;60:504-507)

Key words : 急性骨髄性白血病, 斜台浸潤, 迷走神経麻痺

はじめに

斜台における腫瘍浸潤は脳神経麻痺の原因となるが、その際にはT₁強調像における斜台の低信号化が診断の鍵となる。同所見は見落としやすい所見として神経放射線科の成書にも記載されている¹⁾。斜台浸潤の原疾患として、乳癌や肺癌、前立腺癌が多く、白血病としては急性リンパ性白血病の1例が報告されているのみである²⁾。今回、斜台浸潤による両側舌咽迷走神経麻痺で発症した急性骨髄性白血病 (acute myelogenous leukemia; AML) 症例を経験したので報告する。

症 例

症例：83歳 男性

主訴：魚などバサついた固形物が飲み込みにくい

既往歴：2013年、肺結核と診断され、抗結核薬で完治した。

家族歴：兄がAML。

現病歴：2018年7月上旬、魚などバサついた固形物の飲み込みにくさが出現した。水分の嚥下は問題なかった。他院で実施された血液検査で芽球を含む白血球数上昇、貧血および血小板数低下を認め、当院腫瘍・血液内科を紹介受診した。骨髄検査で、偽性バルゲル核異常、脱顆粒好中球、MPO染色陽性の芽球を40%認めた。FLT3/ITD 遺伝子変異は認めなかった。AMLと診断され、同科に入院した。アザシチジン皮下注射を開始した。治療開始後、血液データは改善傾向となった

が、固形物の摂取困難感は増悪し、水分と一緒に飲み込まないと固形物を摂取できなくなった。そのため当科を紹介された。

入院時現症：身長162cm、体重58kg、体温36.8°C、心拍数78回/分、血圧116/63mmHgで一般理学所見に異常を認めなかった。ECOGのPerformance Statusは2だった。

神経学的所見：構音、眼球運動、顔面に異常なく、カーテン徴候や嚙声は認めず、総じて脳神経系に他覚的な異常を認めなかった。挺舌について、明らかな側方への偏倚は認めなかった。運動系、感覚系、小脳系いずれも明らかな異常所見を認めなかった。易疲労性はなかった。

検査所見：血液検査で、白血球数13,100/ μ l (芽球33%)、Hb 7.8 g/dl、血小板数 5.1×10^4 / μ lだった。肝機能や腎機能、耐糖能、脂質代謝に異常は認めなかった。抗AChR抗体、抗MuSK抗体は陰性だった。嚥下内視鏡検査で発声時に咽頭壁の右方偏倚を認めた。声帯麻痺は認めなかった。嚥下造影検査で喉頭蓋反転不全、咽頭収縮不全、食道入口部開大不全を認めた。これらの結果から左優位の両側舌咽迷走神経麻痺と診断した。頭部MRIは異常なしと診断されていたが再評価を行った。本例は2015年にめまいで当院を受診した際に頭部MRIを撮像しており、その時のT₁強調像と比較すると、斜台は右側優位に低信号化していた (Fig. 1A, B)。斜台以外で、頭蓋冠などの信号変化は認めなかった (Fig. 1C)。拡散強調像では明らかな異常所見を認めなかった (Fig. 1D)。ガドリニウム造影T₁強調像で斜台は高信号を呈し造影効果を認め

*Corresponding author: 東京慈恵医科大学附属柏病院神経内科 [〒277-8567 千葉県柏市柏下163-1]

¹⁾ 東京慈恵医科大学附属柏病院脳神経内科

²⁾ 東京慈恵医科大学附属柏病院腫瘍・血液内科

(Received February 3, 2020; Accepted March 9, 2020; Published online in J-STAGE on June 13, 2020)

doi: 10.5692/clinicalneuro.60.cn-001424

Fig. 1 Brain MRI findings.

A; Axial T₁ weighted imaging (T₁WI) four years prior to admission. The brain MRI T₁WI showed no abnormalities. B, C; Axial T₁WI on admission. The intensity of clivus changed heterogeneous appearance. D; Axial DWI on admission. The clivus appeared to be iso intensity. E; Gadolinium-enhanced T₁WI on admission. The clivus showed contrast effect. F; Axial T₁WI on 62th hospital day. Low intensity lesions of clivus showed no improvement after radiation therapy.

Fig. 2 Clinical course of patient.

We diagnosed as bilateral clivus metastasis of AML by MRI, VE and VF. After initiation of the treatment including radiation therapy, dysphagia shows mild improvement. AML; acute myelogenous leukemia, AZA; azacitidine, VE; videoendoscopy, VF; videofluorography.

(Fig. 1E), AMLの斜台blastomaと診断し、脳神経障害もこれに起因する可能性があると考えた。他部位のblastomaを検索する目的で全身CTを実施し、明らかな異常所見を認めなかった。他の頭蓋骨には信号の変化が見られなかった点から、頭蓋底の輝度変化は白血病に伴うびまん性の骨輝度異常ではなく、頭蓋底に形成された斜台blastomaによるものと考えた。

入院後経過：当科介入後、頭蓋内放射線照射(2 Gy × 5/week)を追加した。画像上、斜台におけるT₁強調像の低信号域は改善しなかったが(Fig. 1F)、嚥下障害は軽減した(Fig. 2)。2回目の嚥下造影検査では喉頭蓋反転不全や咽頭収縮は改善がなかったが、食道入口部開大は前回よりやや改善し梨状窩への残留が特に減少し、喉頭蓋谷の残留も減少した

(Fig. 2). その後神経所見については大きな変化はなく推移したが、徐々に AML の病勢が悪化し、第 201 病日に本症例は死亡した。病理解剖の承諾は得られなかった。

考 察

本症例の最大の特徴は嚥下障害で発症した AML という点である。嚥下困難感の訴えに対し、ベッドサイドの診察では異常を指摘できなかったが、嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査で両側舌咽迷走神経麻痺が診断できた。また、挺舌の左右差がない症例では両側舌下神経不全麻痺を証明するのは困難で、今回両側舌下神経麻痺を示唆する有意な所見は得られなかったが、両側舌下神経の不全麻痺が存在した可能性も否定できないと考えた。

成人発症 AML で、診断時に脳神経麻痺を伴うのは全体の 0.6% 程度と報告されている³⁾。白血球細胞の脳神経麻痺の機序としては、髄膜への浸潤、脳実質内への浸潤、芽球よりなる腫瘍形成、出血傾向や局所の血管破綻による出血、免疫機能低下による感染などが挙げられる^{4) 5)}。本例は髄膜刺激症状が乏しく、画像所見から髄膜や脳実質への浸潤は否定的で、骨髄性細胞よりなる腫瘍形成が機序であると考えた。斜台における腫瘍形成の報告は片側に舌下神経麻痺で発症した急性リンパ性白血病が 1 例あるのみだった⁶⁾。この様に、非常に稀ではあるものの、白血病の症例において、斜台における腫瘍形成が要因となった脳神経麻痺が初期から出現することがある。白血病など癌の既往がある症例で、脳神経障害を疑った場合、鑑別として斜台浸潤の可能性に留意する必要がある。

眼球運動障害や顔面神経麻痺の場合、片側もしくは両側に問わず神経学的異常所見と診断しやすい。しかし、舌咽迷走神経麻痺が両側性に生じると、軟口蓋挙上の左右鎖やカーテン徴候が指摘できず、診断に難渋することがある。本症例

は身体診察のみでは明らかな異常所見を捉えられず、嚥下内視鏡検査と嚥下造影検査による精査で障害を明らかにできた。ベッドサイドの診察で明らかな脳神経麻痺を指摘できないような嚥下障害の鑑別として、嚥下内視鏡検査や嚥下造影検査は時として有用と思われた。

白血病を含む悪性疾患の斜台浸潤は、時として両側性の脳神経麻痺を呈し、嚥下造影検査も時として考慮する必要がある。原因と病態の診断それぞれに難渋するが、見逃さぬよう注意深い診察と画像所見の判読が必要となる。

※本論文に関連し、開示すべき COI 状態にある企業・組織や団体

○開示すべき COI 状態がある者

鈴木一史：講演料：ヤンセンファーマ、武田薬品工業、プリストル・マイヤーズ・スクイブ

○開示すべき COI 状態がない者

向井泰司、作田健一、平野慧、西脇嘉一、谷口洋

本論文に関連し、開示すべき COI 状態にある企業、組織、団体はいずれも有りません。

文 献

- 1) 脳画像の注意すべき読影部位とピットフォール. 柳下章. 神経内科の画像診断. 第 1 版. 東京: 秀潤社; 2011. p. 38-39.
- 2) 上井康寛, 橋本昌也, 鈴木正彦ら. 舌下神経単独麻痺を呈した急性リンパ性白血病の 47 歳女性例. 臨床神経 2013;53: 243-246.
- 3) Alakel N, Stölzel F, Mohr B, et al. Symptomatic central nervous system involvement in adult patients with acute myeloid leukemia. Cancer manag Res 2017;29:97-102.
- 4) 水谷智彦. 白血病と神経障害. Clin Neurosci 1997;15:876-878.
- 5) Nishioka K, Masuda Y, Tomotsu T, et al. Tumor-forming acute myeloid leukemia with facial paralysis. Laryngoscope 1984;94: 829-832.

Abstract**Acute myeloid leukemia diagnosed by dysphagia due to bilateral vagus nerve palsy: a case report**

Taiji Mukai, M.D.¹⁾, Kenichi Sakuta, M.D., Ph.D.¹⁾, Kei Hirano, M.D.²⁾,
Kazuhito Suzuki, M.D., Ph.D.²⁾, Kaichi Nishiwaki, M.D., Ph.D.²⁾ and Hiroshi Yaguchi, M.D., Ph.D.¹⁾

¹⁾ Department of Neurology, The Jikei University Kashiwa Hospital

²⁾ Division of Clinical Oncology/Hematology, The Jikei University Kashiwa Hospital

This is the rare case report that bilateral vagus nerve paralysis was emerged as the initial symptom of acute myelogenous leukemia (AML). An 83-year-old man admitted to our hospital because of dysphagia. His dysphagia progressed two months prior to admission. Although physical examination revealed no abnormality, videoendoscopy and videofluorography examination clearly revealed bilateral vagus nerve palsy. Brain MRI showed hypointense signals at the bilateral clivus on T₁ weighted images, suggesting tumor infiltration to bilateral petroclivus. He was diagnosed as AML by blood samples and bone marrow biopsy. After initiation of the treatment including radiation therapy, dysphagia shows mild improvement. Although bilateral cranial nerve palsy due to malignant tumor involving at the clivus is very uncommon, we should pay attention to the symptom.

(Rinsho Shinkeigaku (Clin Neurol) 2020;60:504-507)

Key words: acute myeloid leukemia, clivus metastasis, bilateral vagus nerve palsy